ICONES SELECTÆ PLANTARUM

Quas in Systemate universali, ex herbariis Parisiensibus, præsertim ex Lesseriano

descripsit AUG. PYR. DE CANDOLLE,

Ex archetypis speceminibus

a P. J. F. TURPIN delineatæ

et

Editæ a BENJ. DE LESSERT

Academiæ Scientiarum socio honorario &c.

VOL. II.

Exhibens Ordines Berberideas, Nymphæaceas, Papaveraceas, Fumariaceas et Cruciferas.

Parisiis,
1825.

INDEX SPECIERUM.

BERBERIDEÆ.

NYMPHÆACEÆ.

PAPAVERACEÆ.

FUMARIACEÆ.

CRUCIFERÆ.

BERBERIDEÆ.

BERBERIS ASIATICA. Tab. I.

BERBÉRIS ASIATICA. ROXB. *Ined. D. C. Syst.* 2. *p.* 15.

B. SPINIS trifidis, simplicibusve, foliis ovalibus, mucronatis, integris aut spinoso-dentatis, racemis brevibus multifloris, pedicellis elongatis, baccis subglobosis. *D. C. l. c.*

CRESCIT in India orientali (Roxb.) in Nepaulia (Wallich) ♄.

EXPLIC. ICON. I. — 1. Flos nondùm apertus auctus. — 2. *Idem* apertus. — 3. Calyx et pistillus corollâ avulsâ. — 4. Calycis sepalum exterius. — 5. Calycis sepalum interius. — 6-7. Petala. — 8. Stamen.

BERBERIS TINCTORIA. Tab. II.

B. TINCTORIA. LESCHEN. *Mem. Mus.* 9. *p.* 506. *D. C. Syst.* 2. *p.* 713 *in add.*

Frutex 20 pedes altus. Caulis lignosus, teres, ramosus, cortice rimoso luteo-cento, sapore valdè amaro; ligno compacto luteo; ramulis glabris, virgatis, subangulatis, aculeatis.

Aculei stipulares profundè tripartiti, partitionibus rigidis, pungentibus.

Folia fasciculata, coriacea, glaberrima, subtùs glauca, obovalia, apice spinoso-mucronata, integerrima, rariùs denticulato-spinosa, denticulis raris, sparsis.

Flores in axillis foliorum racemosi, racemo simplici pedunculato, floribus sat longè pedicellatis.

Fructus: bacca obovoidea, apice incrassata, stylo stigmateque apiculata, glaberrima, glauca, unilocularis, disperma. Semina ovoideo-oblonga, subcompressa, erecta; integumentum crustaceum; embryo orthotropus, erectus, in endospermio subcorneo inclusus.

Crescit in montibus Nelly-Gerry Indiæ orientalis, ubi *Tjakalou* vernaculè dicitur. E ligno corticeque elicitur color luteus, cæteris prestantior. (Vidi specimina fructifera in Herbario Musei Parisini servato, et à clar. *Leschenault* ex Indiâ orientali allata.) ♄.

Hæc species, quam primus recenter sub nomine *Berberidis tinctoriæ* indicavit indefessus peregrinator LESCHENAULT DE LA TOUR (*Mémoires du*

Museum. 9. p. 3o6.), nullo modo à *Berberide asiatica* Roxb. (confer De Cand. *Syst. nat.* 2. p. 3. Delessert, *Icones selectæ.* 2. t. 1.) differre nobis videtur, et cum illâ unam eandemque speciem constituit, ut facillime intelligent qui descriptiones et icones harum surpium quas hic præbemus, comparabunt. In surpo Leschenaultianâ folia subtumora, minus spinoso-dentata varietatem vix notabilem constituunt. Itaque *Berberidem tinctoriam* Lesch. cum *Berberide asiatica* Roxburg conjungi et hocce nomen ut prius-num retinere debet.

Explic. icon. VI. 1. Baccæ integræ. — 2. Eadem longitudinali sectione aperta. — 3. Semen integrum. — 4. Id. longitudinaliter sectum. — 5. Embryo.

MAHONIA FASCICULARIS. Tab. III.

Mahonia fascicularis. D. C. *Syst.* 2. p. 19.

M. foliis 4-5 jugis cum impari; jugo inferiore ad basin petioli approximato, foliolis ovato-lanceolatis repando-dentatis, dentibus utrinque 4-5, racemis erectis confertissimis. *D. C. l. c.*

Crescit in Americæ boreali occidentali circa Monterei et Nutka (Née ex Laguasca) in Novâ-Hispaniâ prope Moran (Humb. et Bonpl.).

Explic. icon. III. — 1. Flos nudus. — 2. 3. 4. 5. Variæ petalorum figuræ. — 6. Pistillum. — 7. Id. longitudinaliter sectus. — 8. Stamen cum petalo. — 9. Fructus. — 10. Id. longitudinaliter sectus. — 11. Id. transversim sectus. — 12. Semen nudum. — 13. Id. longitudinaliter sectum. — 14. Embryo denudatus.

MAHONIA NAPAULENSIS. Tab. IV.

Mahonia napaulensis. D. C. *Syst.* 2. p. 21.

M. foliis 6-jugis cum impari; jugo inferiore minore ad petioli basin approximato, foliolis ovato-lanceolatis, basi 5-nervis, repando-dentatis, dentibus utrinque 5-10, racemis paucis, elongatis, gracilibus. *D. C. l. c.*

Crescit in Napaulâ circa *Harain-Nelly* (Buch. Roxb.).

Explic. icon. V. 1. Flos integrus nudus. — 2. Id. apertus. — 3-4. Sepala. — 5. Calyx cum pistillo. — 6-7. Petala. — 8. Stamen antherâ delitescente.

NYMPHÆACEÆ.

NYMPHÆA RENIFORMIS. Tab. V

N. RENIFORMIS. WALT. *fl. carol.* 155.

N. Folis reniformibus, stigmate 16-radiato. *D. C. Syst.* 2. *p.* 55.

Crescit in Carolinâ (Fraser) ♃.

Explicatio iconis V. — 1. Pedunculus auctus transversim sectus. — 2. Pistillum. — 3. Petalum interius apice vestigia antherae gerens.

NUPHAR JAPONICA. Tab. VI

N. calice 5-petalo, stigmate 15–16 radiato, foliis oblongo-sagittatis, cordatis, auriculis acutis subdistantibus, petiolis teretiusculis. *D. C. Syst.* 2. *p.* 62. Nymphæa lutea. Thunb. *fl. Jap.* 226. *exc. syn.*

Crescit hinc inde in aquis Japoniæ (Thunb.) ♃.

Explic. icon. VI. — Pistillum. — 2. Petalum. — 3. Stamen.

PAPAVERACEÆ.

PAPAVER SETIGERUM. Tab. VII

Papaver setigerum. D. C. *Flor. fr. Suppl. p.* 585.

P. Capsulis glabris obovatis, sepalis subsetosis, caule glabro pauciflorio, foliis amplexicaulibus glaucis inciso-repandis, dentibus setâ terminatis. *D. C. Syst.* 2. *p.* 81.

Crescit in insulis Stoechadum (Requien) ⊙.

Explic. icon. VII. — Capsula transversim secta.

RŒMERIA REFRACTA. Tab. VIII.

R. siliquis 3–4 valvibus glabris, pedicello demum recurvo pendulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 93.

Crescit in Taurid circà *Derbent* (Stevan) ⊙.

Explic. icon. V. J. — 1. Genitalia aucta, calyce corollaque ablata. — 2. Petalum antès visum. — 3. Stamen auctum.

FUMARIACEÆ.

DICLYTRA TENUIFOLIA Tab. IX. f. B.

D. Caulibus 2 brevissimis obtusissimis, scapo nudo 1-5-floro, pedicellis calyce brevioribus, foliis multifidis lobulis linearibus *D. C. Syst.* 2. *p.* 9.

Corydalis tenuifolia. Pursh *Fl. bor. Am.* 2. *p.* 462.

Crescit in Kamtschatka (Pallas) ♃.

Explic. icon. IX. f. B. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum genitalibus.

CORYDALIS PAUCIFLORA Tab. IX. f. A.

C. pauciflora Pers. *Ench.* 2. *p.* 269.

C. caule simplici exsquamato, foliis caulinis 2-3 infrà medium biternatim sectis, segmentis tripartitis lobis obovatis, bracteis ovatis acutis, racemo conferto pauciflore. *D. C. Syst.* 2. *p.* 115.

Crescit in montibus Altaicis Siberiæ (Stephan. Patrin) ♃.

Explic. icon. IX. f. A. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum genitalibus.

CORYDALIS MARSCHALLIANA Tab. X.

C. marschalliana Pers. *Ench.* 2. *p.* 269.

C. caule simplici exsquamato, foliis 2 supra ante biternatim sectis, lobis ovatis integris, racemo brevi, bracteis ovalibus. *D. C. Syst.* 2. *p.* 116.

Crescit in Taurida et promontorii Caucasici nemoribus in Uchranim montibus sylvaticis sub arboribus (Bieberstein) ♃.

Explic. icon. X. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia cum petalis duobus interioribus. — 3. Fructus. — 4. Id. dehiscens. — 5. Semen auctum.

CRUCIFERÆ.

MATHIOLA OXYCERAS. Tab. XI

M. Caule erecto ramoso glanduloso, foliis velutinis sinuato-repandis, superioribus integris, siliquis teretibus subvelutinis glandulosisque, tricuspidatis, cuspidibus internodiis subreflexis. *D. C. l. c. 2. p. 175.*

Crescit in arenosis desertis circa Damascum (Labillardière) ⊙

Explicatio iconis XI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Siliqua, valvis aculeis. — 5. Semen naturali magnitudine. — 6. Id. auctum. — 7. Id. transversim sectum. — 8. Embryo denudatus.

MATHIOLA LIVIDA. Tab. XII.

M. caule subdiffuso ramosissimo, foliis oblongo-lanceolatis, infimis sinuatis, tomento velutino glandulis interspersis, siliquis teretiusculis pubescentibus glandulosisque tricuspidatis, cuspidibus ascendentibus stigmate longioribus. *D. C. Syst. 2. p. 174.*

Cheiranthus lividus Delile. *Ill. Fl. Æg. p. 29. n. 691.*

Crescit in Ægypto desertis prope *Cahirem* ad pagum *Caud-Rey* (Delile) ⊙.

Explic. icon. XII. — 1. Folium auctum. — 2. Flos auctus. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5. Stamen. — 6. Stigma. — 7. Siliqua. — 8. Eadem dehiscens. — 9. Semen auctum.

CHEÏRANTHUS LEPTOPHYLLUS. Tab. XIII.

C. leptophyllus Marsh. Bieb. *Fl. taur. 2. p. 119.*

C. foliis omnibus linearibus lanceolatis integerrimis incanis scabris, caule ramoso siliquisque teretibus incanis patulis. *D. C. l. c. 2. p. 182.*

Erysimum leptophyllum. *D. C. Prodr. Syst. univ. 1. p. 198* (1).

Crescit in collibus siccis Iberiæ (Steven) in subumbrosis, herbidis, sylvaticis, montanis, prope flumen Araguvi (Fischer) ⊙

Explic. icon. XIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum genitalibus. — 3. Petalum. — 4. Genitalia. — 5. Folii fragmentum. — 6. Pilus multiplicatus. — 7. Pilus simplex.

---

1) Ex D. C. Prodr. loc. l. p. 98. *Cheiranthus collinus* C. *leptophyllus* et C. *versicolor* ad Erysimum genus transferri debent, ut jam in Syst. nat. suspicatus est auctor.

NASTURTIUM GLAUCOPHYLLUM. Tab. XIV

N. glaberrimum, foliis radicalibus petiolatis obovato-orbiculatis crenatis coriaceis, summis linearibus squamiformibus. *D. C. l. c. p.* 195.

Crescit in Persiâ propè Teheram (Olivier) ♃.

Explic. icon. XIV. — 1. Siliqua.

NASTURTIUM NATANS. Tab. XV

N. foliis caulinis oblongo-linearibus integris, summis multifido-capillaceis, petalis calyce vix longioribus, siliculis obovato-globosis. *D. C. l. c. p.* 198.

Crescit in aquis stagnantibus subsalsis ad flumen Alei in tractu Kolyvanensi Siberiæ (Patrin) ♃.

Explic. icon. XV. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Pistillum. — 4. Id. cum staminibus.

NOTOCERAS QUADRICORNE. Tab. XVI.

Erysimum quadricorne Steph. *in* Willd. *Sp.* 3. *p.* 614.

N. Siliquis quadricornibus, foliis sinuato-dentatis, pube molli tectosâ. *D. C. l. c. p.* 204.

Crescit in Siberiâ inter Vogham et Kontam fluvium (Stephan) ⊙.

Explic. icon. XVI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4-5. Stamina. — 6. Pilus radiatus. — 7. Siliqua. — 8. Apex siliquæ.

NOTOCERAS HISPANICUM. Tab. XVII.

Dicranotum hispanicum Lagasca *en. hort. matr.* 1815. *p.* 20.

N. siliquis bicornibus, petalis inæqualibus, foliis integris, pilis strigosis centro adfixis bipartitis confertissimis. *D. C. l. c. p.* 204.

Crescit in locis ruderatis Hispaniæ (Lagasca) ⊙.

Explic. icon. XVII. — 1. Pilus. — 2. Pilium. — 3. Flos. — 4. Genitalia. — 5. Stamen. — 6. Petalum. — 7. Silicula. — 8. Silicula dehiscens. — 9. Eadem transversim secta. — 10. Semen. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus. — (Figuræ omnes sunt auctæ).

NOTOCERAS CARDAMINEFOLIUM. Tab. XVIII.

Lepidium cornutum Steph. *Fl. gross.* 1. 617.

N. siliquis bicornibus, foliis pinnatisectis, glabris. *D. C. l. c. p.* 205.

Crescit in Ponto (Tournef.), in agris ad Bosphorum, in insulâ Cypro (Sibth.) ⊙.

Explic. icon. XVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx. — 3. Petalum. — 4. Stamen. — 5. Pistillum. — 6. Silicula. — 7. Eadem dehiscens. — 8. Sectio transversalis siliquæ. — 9. Semen auctum.

BARBAREA PLANTAGINEA. Tab. XIX.

B. foliis inferioribus dentato-pinnatis, lobis lateralibus dentiformibus, terminali maximo subcordato, superioribus ovatis, siliquis subincurvis. *D. C. l. c. 2. p. 208.*

Crescit in Oriente (Tournef. Burm.) ♃.

Explic. icon. XIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx cum pistillo. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum.

STEVENIA ALYSSOÏDES. Tab. XX.

S. alyssoides Ad. et Fisch. *Mem. Soc. nat. mosc.* 5. *p.* 84.

S. caule subadscendente, ramosissimo, siliquis pedicello brevioribus. *D. C. l. c. 2, p. 209.*

Crescit in montibus Siberiæ Werchojansensibus (Adams) ⊙.

Explic. icon. XX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia cum calyce. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5-6. Stamina. — 7. Silica radiatus. — 8. Silicula. — 9. Eadem dehiscens. — 10. Semen naturali magnitudine. — 11. Id. auctum. — 12. Id. transversum sectum. — 13. Embryo denudatus.

STEVENIA CHEIRANTHOÏDES. Tab. XXI.

S. caule stricto erecto simplici aut parcè ramoso, siliquis pedicello longioribus. *D. C. l. c. 2. p. 210.*

Crescit in Siberia ♃.

Explic. icon. XXI. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum pistillo. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5. Folium auctum. — 6. Silica radiatus auctus.

BRAYA ALPINA. Tab. XXII.

B. Alpina. Sternb. et Hoppe *D. C. l. c. 2. p. 211.*

Crescit in Alpibus Carinthiæ superioris (Stern. et Hop.), et Salisburg. (Jacq.) ♃.

Explic. icon. XXII. — 1. Folium. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Genitalia. — 6-7. Stamina. — 8. Siliqua naturali magnitudine. — 9. ex. Eadem aucta. — 10. Semen auctum.

ARABIS ROSEA Tab. XXIII

A. foliis caulinis oblongis, semi-amplexicaulibus, subcordatis dentatis, pube ramosâ scabris, pedicellis calyce longioribus, stigmate apiculato. *D. C. l. c. 2. p.* 215.

Cresceit in Calabriâ circa *Cosenzam* (Thomas).

Explic. icon. XXIII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia calyce ablata. — 3. Petalum. — 4. — Genitalia. — 5. Siliqua.

ARABIS BILLARDIERII. Tab. XXIV

A. foliis paucè-dentatis, pube ramosâ, cano-villosis, subtomentosis, inferioribus obovatis, caulinis, summo oblongo amplexicauli, pedicellis calyce longioribus, siliquis demùm patulis. *D. C. l. c. 2. p.* 218.

Cresceit in Syriâ prope Damascum in monte *Djebel-aher* dicto (Labillardière). ♃.

Explic. icon. XXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Genitalia. — 4. Siliqua delaveata. — 5. Semen auctum. — 6. id. transversim sectum. — 7. Embryo denudatus. — 8-9. Vili radicali.

ARABIS LONGIFOLIA Tab. XXV

A. foliis dentatis, pube ramosâ, cano-pubescentibus, inferioribus obovato-oblongis, longissimè petiolatis, caulinis oblongis, subamplexicaulibus, pedicellis calyce longioribus. *D. C. l. c. 2. p.* 219.

Cresceit in Persiâ (Michaux).

Explic. icon. XXV. — 1. Calyx auctus cum petalis. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum. — 4. Stamen antice visum. — 5. Stamen posticè visum. — 6. Stamen lateraliter visum.

ARABIS CEBENNENSIS. Tab. XXVI

A. foliis omnibus petiolatis, ovatis, acuminatis, grossè dentatis, pube minimâ subvelutinis, pedicellis siliquisque patulis. *D. C. l. c. 2. p.* 234.

Cresceit in locis subumbrosis montium Cebennorum. ♃.

Explic. icon. XXVI. — 1. Flos auctus magnitudine naturali. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum. — 6. Semen magnitudine naturali. — 7. Semen auctum. — 8. Semen ad finem transversim sectum. — 9. Embryo auctus.

ARABIS PATRINIANA Tab. XXVII

A. foliis oblongis acuminatis sub serratis cordato-amplexicaulibus villosis, caule teretiusculo hispido, pedicellis calyce triplò longioribus, siliquis pendulis. *D C l c* n. *p.* 251.

Crescit in Sibiriâ ad Ufam propè *Chamanaikha* (Patrin) ♃

Explic. icon. XXVII. 1. Flos auctus. 2. Petalum. 3. Genitalia. — 4. Calyx. 5. Stamen auctum.

ARABIS CANADENSIS Tab. XXVIII.

A. canadensis. *L. sp.* 929.

A. foliis caulinis sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis subdentatis, pedicellis calyce triplò longioribus, siliquis pendulis subfalcatis. *D C l c* n. *p.* 258.

Crescit in rupibus umbrosis Americæ septentrionalis, à Canadâ ad Virginiam ♃

Explic. icon. XXVIII. 1. Flos auctus. — 2. Calyx erectus. — 3. Petalum. — 4. Stamen. 5. Genitalia. 6. Semen auctum. — 7. Id. transversum sectum. 8. Embryo denudatus auctus.

CARDAMINE TUBEROSA Tab. XXIX.

C. foliis glabris radicalibus longè petiolatis reniformibus caulinis pinnatim trisectis, radice tuberosa. *D C. l. c.* n. *p.* 254.

Crescit in Chili (Dombey) ♃

Explic. icon. XXIX. — 1. Genitalia. — 2. Calyx cum pistillo. — 3. Petalum. — 4. Stamen auctum intùs visum. 5. Id. externâ facie.

CARDAMINE HEDERACEA Tab. XXX. f. A.

C. foliis petiolatis glabris pinnatisectis, segmentis 5 petiolatis latè ovatis obtusè trilobis, siliquis erectis. *D. C. l. c.* n. *p.* 264.

Crescit in Syriâ (Labillardière) ♃

Explic. icon. XXX. f. A. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. 3. Fructus.

CARDAMINE PETIOLARIS Tab. XXX. f. B.

C. foliis longè petiolatis glabris pinnatisectis, segmentis 9-10 petiolatis ovatis denticulatis sublobatis, siliquis erectis. *D. C. l. c.* n. *p.* 264.

Crescit ad Caucasum septentrionalem propè Mosdock (Goldbach)

Explic. icon. XXX. f. 1. Flos auctus. 2. Genitalia aucta. 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Fructus.

CARDAMINE GLAUCA Tab. XXXI

C. glauca Sprengel. *in Litt.*

C. foliis petiolatis glabris glaucis subcarnosis pinnatisectis, segmentis 5-9 oblongis, terminali 3-lobo, caule diffuso ramosissimo siliquis erectis glabris. *D. C. l. c. 2. p.* 266.

Crescit in aspero monte propè Reggio in Calabriâ (L. Thomas) ♃

Explic. icon. XXXI. — 1. Flos superius. — 2. Calyx auctus cum genitalibus. — 3. Petalum. — 4. Germen cum glandulis basilaribus. — 5. Stamen initio vinum. 6. Stamen exitio vinum. — 7. Siliqua non aperta. — 8. Valvea aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 9. Semen auctum. — 10. Id. transversum sectum. — 11. Embryo denudatus.

CARDAMINE MARITIMA Tab. XXXII.

C. foliis petiolatis glabris glaucis pinnatisectis, segmentis 5-7 ovato-cuneatis repandis, caule diffuso ramosissimo, siliquis erectis glabris. *D. C. l. c. 2. p.* 266.

Crescit in Dulmatiae pomaniali Sobioncello, ad littora maris ⊙.

Explic. icon. XXXII. — 1. Folium auctum. — 2. Flos auctus. 3. Calyx. — 4. Genitalia. — 5. Petalum. — 6. Siliqua. 7. Siliqua dehiscens. 8. Semen naturali magnitudine. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversum sectum. — 11. Embryo denudatus.

DENTARIA QUINQUEFOLIA Tab. XXXIII.

D. quinquefolia. Marsh.-Bieb. *Fl. cauc.* 2. *p.* 189.

D. foliis caulinis 3 alternis verticillatisve pinnatisectis, segmentis 5-7 oblongo-lanceolatis grosse dentatis, terminalibus non confluentibus. *D. C. l. c. 2. p.* 277.

Crescit sub arboribus in sylvis Taurim et Caucasi, et ad Ukrainam (Marsh.-Bieb.) ♃

Explic. icon. XXXIII. — 1. Plantae rhizoma. — 2. Calyx. — 3. Genitalia aucta. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen id.

FARSETIA ERIOCARPA Tab. XXXIV.

F. caulibus erectis basi suffruticulosis, foliis oblongis, siliculis dense sericeo-tomentosis. *D. C. l. c. v. p.* 288.

Crescit in insulâ Cypro (Labillardiere) ♃.

Explic. icon. XXXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Flos. — 3. Calyx cum pistillo. 4. Genitalia. — 5. Stamen. — 6. Petalum. — 7. Semen. — 8. id. transversum sectum. 9. Embryo denudatus.

VESICARIA VESTITA Tab. XXXV.

V. vestita. Desv. *Journ. bot.* 3. *p.* 171 *et* 185.

V. calyce persistente, foliis linearibus acutis tomentosis integris. *D. C. l. c. p.* 209.

Crescit in Persiâ (Mich.) ♃.

Explic. icon. XXXV. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Stamen auctum. 4. Petalum. — 5. Calyx auctus cum pistillo, petalis staminibusque avulsis. — 6. Silicula dorso visa. — 7. Silicula suturâ lateralî visa. — 8. Flos stellatus auctus.

SCHIVERECKIA PODOLICA Tab. XXXVI.

Schiverecckia Podolica. *Andr. et Bess. in litt. D. C. l. c. v. p.* 300.

Crescit in Podoliâ (Bess.), in Wolhyniâ (Stor.), in Siberiâ ♃.

Explic. icon. XXXVI. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus, foveaculo. 3. Genitalia aucta. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum, filamento appendiculato. — 6. Silicula dorso visa. — 7. Eadem suturâ lateralî visa. — 8. Eadem aperta, valvis inferne dehiscentibus. — 9. Eadem aperta, valvis abfractis, dissepimento seminibusque patentibus. — 10. Semen auctum. — 11. id. transversum sectum. — 12. Embryo denudatus.

ALYSSUM SPATHULATUM Tab. XXXVII.

A. spathulatum Steph. in Willd. *Sp.* 3. *p.* 465.

A. caulibus basi suffruticulosis, foliis spathulato-obovatis, petiolis canovelutinis, siliculis orbiculatis, stylo paulò longioribus, seminibus margineatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 300.

Crescit in montibus Siberiæ Altaicis (Fischer) in Siberiâ orientali hyperboreâ (Adams), ♃.

Explic. icon. XXXVII. — 1. Folium auctum. — 2. Folii frustulum auctum, pilis stellatis

constum. 3. Flos auctus. — 4. Genitalia aucta. — 5. Calyx auctus cum pistillo. — 6. Petalum auctum. — 7. Stamen auctum intus visum. 8. id extus visum. — 9. Silicula aucta dorso visa, stylo superata. — 10. Eadem valvis abiectis dissepimento seminesque unico superstite patentibus. — 11. Semen auctum.

ALYSSUM OBTUSIFOLIUM. Tab. XXXVIII.

A. OBTUSIFOLIUM. Steven *Ined.*

A. caulibus basi suffruticulosis pube stellatâ pubescentibus, foliis obovato-spathulatis obtusis, subtùs argenteis, siliculis ovato-orbiculatis subventrosis seminibus immarginatis. *D. C. l. c. 2. p. 305.*

Crescit in Taurià meridionali et in Sibiriâ (Steven). ♃

Explic. icon. XXXVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx absque corollâ. 3. Petalum auctum. — 4. Genitalia aucta. 5. Stamen auctum intus visum, filamento appendiculato. — 6. Stamen auctum extus visum absque filamenti parte inferiore. 7. Germen auctum. 8. Silicula aucta non aperta dorso visa. 9. Eadem aperta dissepimento seminibus valvisque juncta stellatis omnibus patentibus. 10. Semen auctum. — 1 bis. Folium inferius caulinarium pilis stellatis obtectum. — 2 bis. Folium superius caulinarium. — 3 bis. Pilus stellatus auctus.

ALYSSUM MICROPETALUM. Tab. XXXIX.

A. MICROPETALUM. Fischer. *Ined.*

A. caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis, siliculisque hirsutis orbiculatis stylo duplò longioribus longè racemosis. *D. C. l. c. 2. p. 313.*

Crescit in Iberiâ Mediâ (Bieb), propè Tiflim (Fischer). ⊙.

Explic. icon. XXXIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum, filamento appendiculato denticulato. 5. Silicula aucta, pilis radiatis vestita. 6. Eadem valvis seminibus dissepimentoque segregatis. — 7. Folium auctum, pilis stellatis obsitum.

ALYSSUM HIRSUTUM. Tab. XL.

A. HIRSUTUM. Bieb. *Fl. taur. 2. p. 98.*

A. caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis hirsutis, siliculis orbiculatis tuberculato-hirsutis longè racemosis stylo triplò longioribus. *D. C. l. c. 2. p. 314.*

Crescit in Tauriâ et Iberiæ campis aprricis (Bieb). ⊙

Explic. icon. XL. — 1. Flos auctus. — 2. id absque corollâ. — 3. Genitalia aucta.

4. Pistillum. — 5. Stamen intus visum. — 6. Id. extùs visum. 7. Germen hirsutissimum. — 8. Siliculæ aucta dorso visa. — 9. Eadem aperta, valvis dissepimentoque segregatis. — 10. Semen magnitudine naturali. — 11. Id. auctum. — 12. Filus malpighiaceus. 13. Pilus stellatus auctus.

ALYSSUM MACROCARPUM Tab. XLI.

A. caule fruticoso ramoso subspinescente, foliis oblongis obtusis argenteis, siliculis obovato-orbiculatis subemarginatis glabris stylo apiculatis 8-ovulatis. *D. C. l. c. 2. p. 52.*

Crescit in Cilicomis et Pyrenæis orientalibus ♄

Explic. icon. XLI. Folia frustulum stellato-pilosum. 2. Flos separatus. — 3. Calyx auctus cum pistillo. 4. Petalum. 5. Genitalia aucta. 6. Stamen intùs visum. — 7. Id. extùs visum. 8. Pilus stellatus auctus. 9. Siliculæ aucta. — 10. Eadem aperta. — 11. Semen magnitudine naturali. 12. Id. auctum.

MENIOCUS LINIFOLIUS. Tab. XLII.

M. SERPYLLIFOLIUS Desv. *Journ. 3. p. 173.*

M. linifolius. *D. C. l. c. 2. p. 326.*

Crescit in ruderatis et cultis circa Astracan (Fischer) in Taurid. Caucaso (Bieb), in Syriâ (Russel) inter Alep et Mossul (Olivier), in Podoliâ, Illyriâ, etc. ⊙.

Explic. icon. XLII. — Folium stellato-pilosum. 2. Pilus stellatus auctus. 3. Flos auctus non apertus. — 4. Germen auctum. — 5. Genitalia aucta. — 6. Stamen auctum, filamento appendiculato. — 7. Siliculæ aucta. — 8. Eadem aperta. — 9. Semen magnitudine naturali. 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo detundatus.

PELTARIA GLASTIFOLIA Tab. XLIII.

P. foliis caulinis sagittato-amplexicaulibus, siliculis planiusculis rugulosis coriaceis. *D. C. l. c. 2. p. 330.*

Crescit in Oriente inter Alep et Mossul. (Olivier) ⊙.

Explic. icon. XLIII. — 1. Flos auctus. 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Stamen. 6. Siliculæ. — 7. Eadem dehiscens. — 8. Eadem transversim secta.

DRABA INCOMPTA Tab. XLIV.

D. INCOMPTA Steven *in* Bieb. *Fl. caucas. Suppl. p. 427.*

D. scapis velut ut folia triplo longioribus, foliis oblongis pilis stellatis conoveluti, pedicellis flore brevioribus. *D. C. l. c. 2. p. 340.*

Crescit in Caucasi orientalis Alpe Tyfendagli ♃

Explic. icon. XLIV — 1. Folium auctum piloso-stellatum. — 2. Flos auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Calyx auctus cum pistillo. 5. Petalum auctum. 6. Siliculæ auctæ

DRABA MOLLISSIMA Tab. XLV

D. mollissima Steven in Bieb. *Fl. caucas. Suppl. p.* 426

D. scapis nudis glabris foliis multò longioribus, foliis oblongis pube stellatâ cano-velutinis, pedicellis flore longioribus. *D. C. l. c. n. p.* 342

Crescit in Caucasi orientalis Alpe Schoteag. (Steven) ♃.

Explic. icon. XLV — 1. Folium auctum piloso-stellatum. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum infra visum. 7. Id. extra visum.

DRABA LÆVIPES. Tab. XLVI. f. A

D. scapis nudis monophyllisve pubescentibus, foliis ovatis pube stellatâ brevi tomentosis, siliculis oblongato-linearibus pedicellisque glaberrimis. *D. C. l. c. n. p.* 346

Crescit in rupibus Pyrenæorum centralium editorum ♃

Explic. icon. XLVI f. A — Filus stellatus stipitatus

DRABA STELLATA Tab. XLVI. f. B.

D. stellata Jacq. *H. Vindob.* t. 3. *Obs. n.* 59. *t.* 4. *f.* 5.

D. scapis monophyllis pubescentibus, foliis ovato-oblongis, pube stellatâ brevi tomentosis. pedicellis puberulis siliquis oblongis. *D. C. l. c. n. p.* 346.

Crescit in fissuris rupium locis editissimis apricis Pyrenæorum, Aspium Galliæ provinciæ, Helvetiæ. Delphinatûs, etc ♃

Explic. icon. XLVI. Fig. B. 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum pistillo. 3. Genitalia aucta. 4. Petalum auctum. 5. Stamen auctum. — 6. Fructus non apertus. 7. Id. apertus — 8. e. 9. Folia piloso-stellata. — 10. Filus radiatus stipitatus.

DRABA GRANDIS. Tab. XLVII.

D. caule ramoso foliosо puberulo, foliis puberulis inferioribus ovalibus longè cuneatis grosse dentatis, siliculis ovatis glabris, septo fenestrato. *D. C. l. c. n. p.* 355

Cochlearia septentrionalis. *D. C. Prod.* v. 1. *p.* 174. (*).

Crescit in Siberiæ septentrionalis locis humidis ad mare glaciale, et in insulâ Sancti-Pauli inter Kamtschatkam et Americam (Langsdorff).

Explic. icon. XLVII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5. 6. Stamina. — 7. Siliquula. — 8. Eadem dehiscens. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

COCHLEARIA PYRENAICA. Tab. XLVIII.

C. officinalis. Lapeyr. *Abr. pyr.* 368.

C. siliculis obovatis subglobosis pedicelli longitudine, foliis radicalibus cordato-reniformibus integris, caulinis paucis ovatis dentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 365.

Crescit secùs rivulos in summis Pyrenæorum centralium convallibus.

Explic. icon. XLVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Calyx auctus. — 5. Siliculæ auctæ. — 6. Eadem semi-apertæ. — 7. Eadem valvis ablatis dissepimento seminibusque patentibus. — 8. Semen magnitudine naturali. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

COCHLEARIA VELUTINA. Tab. XLIX.

C. siliquis oblongis pedicello dimidiò incrassatioribus, foliis parùm ramosè velutinis radicalibus pinnatipartitis, caulinis sagittatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 370.

Crescit in Mesopotamiâ inter Aleppo et Mossul (Olivier) ⊙.

Explic. icon. XLIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Petalum auctum. — 5. Ovarium auctum. — 6. Siliqua aucta. — 7. Eadem semi-aperta, dissepimento seminibusque patentibus.

COCHLEARIA SAXIFRAGÆFOLIA. Tab. L.

C. siliculis ovato-oblongis, foliis glabris, radicalibus petiolatis reniformibus palmatim incisso-dentatis, caulinis ovatis trilobis, summis linearibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 370.

Crescit in Persiâ ad montem Elwand (Olivier) ♃.

Explic. icon. L. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Stamen auctum. — 5. Siliqua aucta.

(*) Ad Cochlearias genus ut jam in Syst. nat. suspicatus erat auctor, hæc species certò referenda ex Cl. Andrzejowski.

THLASPI LATIFOLIUM Tab. LI

T. LATIFOLIUM. MARSH.-BIEB. *Fl. caucc.* 2. *p.* 99.

T. foliis radicalibus longè petiolatis cordatis repando-dentatis, caulinis ovato-cordatis breviter petiolatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 574.

Obs. Ex Cl. Andrzejowski observatione, septum siliculæ in hâc specie duplex evadit, unde forsan non leviter confirmatur doctrina, circà septi indolem, exposita in Dissert. de Cruciferis in Mem. Mus. 7. p. 169.

CRESCIT in Iberiæ sylvis (Bieb.), ad Caucasum septentrionalem (Fischer) ♃.

EXPLIC. ICON. LI. — 1. Calyx auctus. — 2. Petalum auctum. — 3. Genitalia aucta. 4. Stamen auctum. — 5. Siliculæ aucta. — 6. Eadem aperta. — 7. Eadem longitudinaliter secta. — 8. Eadem semoribus ablatis. — 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Semen auctum. — 11. Embryo denudatus.

THLASPI COCHLEARIFORME Tab. LII.

T. foliis subcarnosulis, radicalibus petiolatis ovatis subdentatis, caulinis cordato-amplexicaulibus, petalis calyce majoribus, siliculis oblongis subemarginatis 8-spermis, stylo brevi filiformi. *D. C. l. c.* 2. *p.* 581.

CRESCIT in Sibiriâ et Daluriâ (Patrin) ♃.

EXPLIC. ICON. LII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum genitalibus. — 3. 4. Petala. — 5. Pistillum. — 6. Siliculæ. — 7. Eadem transversalim secta. — 8. Eadem dehiscens. 9. Semen auctum. — 10. id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

HUTCHINSIA TRINERVIA. Tab. LIII

H. foliis integerrimis trinervis ovali-oblongis sessilibus basi subcordato-amplexicaulibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 387.

CRESCIT in Persiæ monte Elwand (Michaux, Olivier) ♃.

EXPLIC. ICON. LIII. — Folium caulinarium. 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cum genitalibus. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum intus visum. — 7. Id. extus visum.

IBERIS CONFERTA Tab. LIV

I. CONFERTA. *Lagasca varied.* 22. n. 22. 1806.

I. caule suffruticoso humillimo. foliis subrudiculibus confertissimis sublinearibus acutis glabris. scapo racemifero nudo. *D. C. l. c.* 2. *p.* 398.

Crescit in montibus Hispaniæ (Lag.) ♃

Explic. icon. LIV — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Stamen auctum. — 5. Silicula aucta. — 6. Ead. aperta, valvis separatis, dissepimento seminibusque patentibus. — 7. Semen auctum. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

BISCUTELLA ERIGERIFOLIA. Tab. LV

B. erigerifolia D C *Duv. n.* 2.

B. calycibus obtusè bicalcaratis silicelis glabris ovoibus in stylum apice subcoarctatibus. *D C. Syst.* 2. *p.* 408.

B. auriculata. Dufour *in Ann. gen. sc. nat. p.* 298.

Crescit inter segetes in Hispaniâ ⊙.

Explic. icon. LV — Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum pistillo. — 3. Pistillus et stamen auctum intùs visum. — 4. Id. extùs visum. — 5. Petalum auctum. — 6. Silicula aucta. — 7. Semen magnitudine naturali. — 8. Id. auctum.

MENONVILLEA LINEARIS. Tab. LVI.

Menonvillea linearis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 420.

Crescit in Peruviâ (Dombey), in Chili (Ruiz et Pavon).

Explic. icon. LVI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx cum genitalibus. 4. Stamen. — 5. Petalum. — 6. Silicula. — 7. Eadem dehiscens. — 8. Eadem transversim secta. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

CAKILE ÆQUALIS. Tab. LVII

C. siliculæ articulo superiore basi subtetragono apice longè rostrato. *D C l. c.* 2. *p.* 430.

Crescit in Martinicâ (L. C. Richard.) ⊙.

Explic. icon. LVII. 1. Petalum auctum. 2. Calyx auctus cum genitalibus. 3. Stamen auctum intùs visum. 4. Id. extùs visum. 5. Ovarium auctum. 6. Silicula. — 7. Ead. aucta, longitudinaliter secta. — 8. Ead. transversim secta. 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus. — 13. Folium caulinorum.

CHORISPORA IBERICA. Tab. LVIII.

C. siliquis hirtis vix stylo longioribus, foliis linearibus runcinato-dentatis. *D C. l. c.* 2. *p.* 437.

Crescit in Iberia lapidosis (Steven) ⊙.

Explic. icon. LVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus. — 3. Petalum auctum. — 4. Genitalia aucta. — 5. Ovarium cum glandulis cauliferis. — 6. Stamen auctum.

N. B. In titulo iconis LVIII lege Chorisporam Ibericam nec C. Sibiricam.

MALCOMIA INCRASSATA. Tab. LIX.

M. caule multiplici subdiffuso, foliis ovalibus petiolatis, superioribus oblongis pube adpressâ hipartitâ, pedicellis calyce brevioribus post anthesim incrassatis, siliquis pubescentibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 441.

Crescit in insulis Scio et Tenedos (Olivier) ⊙.

Explic. icon. LIX. — 1. Flos. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Calyx cum genitalibus. — 5-6. Stamen auctum.

MALCOMIA BROUSSONETII. Tab. LX.

Cheiranthus villosus L. *Sp.* 925?

M. caule erecto ramoso, foliis oblongis obtusis sinuatis, pube stellatâ tomentoso-canis, pedicellis calyce brevioribus siliquis pubescentibus torulosis stylo longo terminatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 445.

Crescit in agro Mogadoriensis (Broussonet) ⊙.

Explic. icon. LX. — 1. Calyx genitalia includens. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Stamen auctum. — 5. Pilus radiatus auctus.

HESPERIS ALYSSIFOLIA. Tab. LXI.

H. pedicellis villosis calyce villosissimo vix longioribus, petalorum laminis oblongis emarginatis, foliis oblongis integerrimis pube stellatâ velutinis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 447.

Crescit in Persiâ (Michaux).

Explic. icon. LXI. — 1. Pilus radiatus. — 2. Flos auctus. — 3. Petalum. — 4. Genitalia.

HESPERIS APRICA. Tab. LXII.

H. aprica. Poiret. *Suppl.* 3. *p.* 194.

H. pedicellis glanduloso-pilosis calycis longitudine, petalorum laminis obovatis, foliis oblongis obtusis caulique simplici ciliato-hispidis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 452.

Crescit in campis apricis Siburiae et Daluriae ♃

Explic. icon. LXII. — 1, 2. Folia. — 3. Calyx cum genitalibus. — 4. Genitalia. — 5. Petalum. — 6. Stamen antico visum. — 7. Id. postico. — 8. Siliqua dehiscens. 9. Semen auctum.

SISYMBRIUM EXACOIDES Tab. LXIII. f. A.

S. foliis ovali-oblongis subintegris glabris glaucis, racemis 1-4 floris. *D. C. l. c. p.* 485.

Crescit in Libano, loco dicto *Zaale* (Labill.) ⊙.

Explic. icon. LXIII. f. A. Planta naturali magnitudine. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Genitalia. — 4. Siliqua. — 5. Semen auctum. — 6. Id. transversim sectum. — 7. Embryo denudatus.

SISYMBRIUM CONTORTUPLICATUM Tab. LXIII. f. B.

Cheiranthus contortuplicatus. Stemb. *in* Willd.

S. foliis oblongis radicalibus pinnatifidis, caulinis dentatis aut integris, pedicellis calycis longitudine, siliquis hispidis sceptris contortuplicatis. *D. C. l. c. p.* 485.

Crescit in deserto Cumano (Bieb. Stev.) ⊙.

Explic. icon. LXIII. f. B. Planta naturali magnitudine. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx id. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5-6. Siliquae. — 7. Siliquae apectae fragmentum. 8. Semen naturali magnitudine. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus. — 12. Pilus radiatus.

SISYMBRIUM LYRATUM Tab. LXIV.

S. lyratum. Burm. *Fl. cap.* 17.

S. foliis inferioribus pilosis lyrato-runcinatis lobis dentatis, superioribus oblongis glabris dentatis, siliquis subpatulis glabris. *D. C. l. c. p.* 471.

Crescit ad Caput Bonae-Spei (Burm.) ♃

Explic. icon. LXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Calyx. 5. Semen naturali magnitudine. — 6. Id. auctum. — 7. Embryo denudatus.

ERYSIMUM SILICULOSUM Tab. LXV.

Cheiranthus siliculosus. Bess. *Fl. caucas.* 2. *p.* 121.

E. siliquis stylo brevioribus junioribus calyce persistente tectis, floribus breviter pedicellatis, foliis linearibus integris. *D. C. l. c. p.* 491.

3.

Crescit in arenâ mobili deserti Cumani Taurice (Bieb.), circâ Astracan (Stev.).

Explic. icon. LXV. — 1. Calyx auctus non apertus. — 2. Petalum auctum. — 3. Calyx auctus. — 4. Stamen auctum antrorsum visum. — 5. Id. posticè visum. — 7. Genitalia aucta. — 8. Ovarium auctum, cum stylo et stigmate. — 9. Id. transversim sectum, seminibus patentibus.

ERYSIMUM AUREUM Tab. LXVI.

E. aureum. Marsch. Bieb. *Fl. caucas. 2. p.* 117.

E. foliis lanceolatis acuminatis dentatis pubescentibus viridibus, ramis siliquisque patentibus, stigmate crasso bilobo subpedicellato. *D. C. l. c. 2. p.* 498.

Crescit in dumetis Caucasi (Bieb.) ⊙.

Explic. icon. LXVI. — 1. Fragmentum caulis, foliumque caulinarium. — 2. Pilus stellato-tripartitus auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Flos paululùm auctus. 5. Calyx auctus cum pistillo. — 6. Petalum auctum. — 7. Siliqua.

ERYSIMUM RIGIDUM Tab. LXVII.

E. foliis linearis-lanceolatis acutè dentatis, siliquis patulis glabris rigidis, stylo vix ullo. *D. C. l. c. 2. p.* 505.

Crescit in Oriente (Labill.).

Explic. icon. LXVII. — 1. Siliqua. — 2. Eadem transversim secta. — 3. Semen naturali magnitudine. 4. Id. auctum. — 5. Id. transversim sectum. — 6. Embryo demudatus.

LEPTALEUM PYGMÆUM. Tab. LXVIII.

L. foliis ferè omnibus pinnatipartitis, caule aliquis glabris submuricatis breviore. *D. C. l. c. 2. p.* 511.

Crescit in Persiâ (Michaux) ⊙.

Explic. icon. LXVIII. — 1. Folium auctum. — 2. Flos auctus. 3. Calyx auctus. 4. Petalum auctum. — 5. Genitalia aucta. — 6. Siliqua aucta. — 7. Ead. aperta, seminibus patentibus. — 8. Semen auctum.

CAMELINA MICROCARPA Tab. LXIX.

C. microcarpa. Andrz. *Crucif. ined.*

C. siliculis pyriformibus uncostatis stylo longiusculo superatis, foliis lanceolatis denticulatis hispidis. *D. C. l. c. 2. p.* 517.

Crescit in Podoliâ ♃.

Explic. icon. LXIX. 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5-6. Stamen. — 7. Siliculæ. — 8. Eadem aperta. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

CAMELINA BARBAREÆFOLIA Tab. LXX.

C. siliculis globosis, foliis oblongis pinnatifidis basi obtusè auriculatis, caule basi villoso. *D. C. l. c. n. p.* 517.

Crescit in Sibiriæ orientalis provinciâ Ircutianâ propè Doromnsk (Vlasow) ♃.

Explic. icon. LXX. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx. — 3. Stamen. — 4. Pistillum. — 5-6. Siliculæ. — 7. Semina naturali magnitudine. — 8. Semen auctum.

SENEBIERA SERRATA Tab. LXXI.

S. serrata. Poiret *Dict.* 7. *p.* 76.

S. foliis oblongis inciso-serratis, siliculis compressis rugosis. *D. C. l. c. n. p.* 526.

Crescit in Montevideo Brasiliæ (Commerson).

Explic. icon. LXXI. — 1. Flos auctus. — 2. Siliculæ. — 3. Eadem longitudinaliter secta. — 4. Eadem transversim secta. — 5. Semen auctum. — 6. Embryo denudatus.

LEPIDIUM SPINESCENS. Tab. LXXII.

L. siliculis ovalibus subolatis emarginatis foliis apice incisis, racemorum rachibus apice spinescentibus. *D. C. l. c. n. p.* 554.

Crescit in Syriâ circâ Damascum (Labillard.).

Explic. icon. LXXII. — 1. Siliculæ. — 2. Eadem dehiscens. — 3. Semen. — 4. Id. transversim sectum. — 5. Embryo denudatus.

LEPIDIUM AFRICANUM Tab. LXXIII.

Thlaspi africanum. Burm. *Prodr. fl. cap. p.* 17.

L. siliculis ellipticis stigmate sessili apiculatus, foliis radicalibus lyrato-pinnatisectis, lobis inciso, terminali maximo, medius pinnatisectis incisive, summis integris. *D. C. l. c. n. p.* 554.

Crescit ad Caput Bonæ-Spei ♃.

Explic. icon. LXXIII. — 1. Flos auctus. — 2. Stamen. — 3. Siliculæ. — 4. Eadem dehiscens. — 5. Semen naturali magnitudine. — 6. Id. auctum. — 7. Id. transversim sectum. — Embryo.

ÆTHIONEMA CRISTATUM. Tab. LXXIV.

Thlaspi cristatum. Poiret *Dict.* 7. *p.* 541.?

Æ. siliculis bilocularibus 2-4 spermis orbiculatis basi et apice emarginatis, valvulis dorso alatis grosse cristato-dentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 560.

Crescit in Syriâ, Persiâ ⊙

Explic. icon. LXXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum genitalibus. — 3. Ovarium auctum. — 4. Siliculæ auctæ. — 5. Ead. apertæ, dissepimento seminibusque patentibus. — 6. Ead. transversim secta. — 7. Dissepimentum auctum. — 8. Semen magnitudine naturali. — 9. Id. auctum lateraliter visum. — 10. Id. auctum facie anteriore visum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus lateraliter visus. — 13. Id. facie anteriore visus, radicula dorsali conspicuâ.

ÆTHIONEMA MEMBRANACEUM. Tab. LXXV.

Lepia membranacea. Desv. *Journ.* 5. *p.* 166 *et* 181.

Æ. siliculis bilocularibus 2-spermis obcordatis confertis, valvulis dorso alatis integris, foliis linearibus distantibus strictè adpressis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 560.

Crescit in Persiæ monte Elwend (Michx.) ♃

Explic. icon. LXXV. — 1. Pistillum. — 2. Siliculæ. — 3. Eadem dehiscens.

ÆTHIONEMA CORDIFOLIUM. Tab. LXXVI.

Æ. siliculis bilocularibus 2-spermis obcordatis confertis, valvulis dorso alatis integris, foliis linearibus confertis, inferioribus petiolatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 560.

Crescit in monte Libano (Labill.) ♃

Explic. icon. LXXVI. — 1. Fragmentum caulinarium cum foliis. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cum staminibus. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum intus visum, filamento dilatato et appendiculato. — 7. Siliculæ auctæ. — 8. Ead. apertæ seminibus patentibus. — 9. Ead. transversim secta. — 10. Semen auctum.

ISATIS GARCINI. Tab. LXXVII.

Peltaria Garcini. Burm. *Fl. ind.* 139. *t.* 46. *f.* 1.

I. siliculis latè marginatis obovatis basi cuneatis, subpedicellatis apice obtusissimis tuberculatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 565.

Crescit in Persiâ (Garcin.)

ISATIS LITTORALIS. Tab. LXXVIII.

I. siliculis oblongo-cuneatis obtusissimis truncato-emarginatis, basi attenuatis glaberrimis latitudine majore triplò longioribus, loculis utrinque exsertis et sulco ab alâ distinctis. *D. C. l. c. 2. p.* 568.

Crescit in Taurisi littoribus circà Sudak (Steven).

Explic. icon. LXXVIII. 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum antèa visum. 5. Id. extùs visum. — 6. Fructus auctus apertus. — 7. Id. transversim sectus. 8. Semen magnitudine naturali. 9. Semen auctum. — 10. Id. transversim sectum. 11. Embryo denudatus.

ISATIS HEBECARPA. Tab. LXXIX.

I. siliculis oblongo-cuneatis obtusissimis velutinis basi sub-attenuatis latitudine vix ultrà duplò longioribus, loculis sulco lateali destitutis. *D. C. l. c. 2. p.* 569.

Crescit in Taurisi littoribus circà Sudak (Steven).

Explic. icon. LXXIX. — 1. Flos auctus. 2. Calyx auctus. — 3. Genitalia aucta. 4. Petalum auctum. — 5. Stamen antèa visum. 6. Id. extùs visum. 7. Fructus. — 8. Id. transversim sectus. — 9. Id. apertus, semine conspicuo. — 10. Semen auctum. — 11. Embryo denudatus.

SOBOLEWSKIA LITHOPHILA. Tab. LXXX.

S. lithophila. Bieb. *Cent. pl. rar. ross.* 2. *t.* 59. D. C. *l. c.* 2. 575.

Crescit in Taurisi rupestribus, passimque in Iberiâ.

Explic. icon. LXXX. 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Pistillus calyce tectus. — 4. Petalum. — 5. Siliqua.

GOLDBACHIA LÆVIGATA. Tab. LXXXI.

Raphanus lævigatus. Bieb. *Fl. taur.* 2. *p.* 129.

G. siliquis isthmo biarticulatis lævibus pendulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 577.

Crescit in arenâ mobili circà Astrakan rarius in deserto Cumano (Bieb) ⊙.

Explic. icon. LXXXI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Stamen. 5. Petalum. — 6. Silicula. — 7. Silicula longitudinaliter secta. — 8. Semen naturali magnitudine. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

ANCHONIUM BILLARDIERII. Tab. LXXXII.

ANCHONIUM BILLARDIERII. *D. C. l. c. 2. p.* 578.

CRESCIT in Syriae monte Libano (Labill.) ♃.

EXPLIC. ICON. LXXXII. — 1. Folii fragmentum. — 2. Flos radiatus. — 3. Flos anectus. — 4. Stamina duo majora connata. — 5. Petalum. — 6. Genitalia. — 7. Siliqua. — 8. Faciem longitudinaliter secta. — 9. Semen. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo.

STERIGMA SULFUREUM. Tab. LXXXIII.

CHEIRANTHUS SULFUREUS. RUSSEL *in* SCHRAD. *Journ.* 1. *p.* 426.

S. foliis inferioribus runcinato-pinnatifidis summis integris. *D. C. l. c. 2. p.* 580.

CRESCIT in Syriâ prope Aleppum (Russel et Olivier) ⊙.

EXPLIC. ICON. LXXXIII. — 1. Flos anectus. — 2. Calyx cum genitalibus. — 3. Petalum. 4. Stamen. — 5. Stamina duo majora connata. 6. Genitalia.

STERIGMA ELYCHRYSIFOLIUM. Tab. LXXXIV.

S. foliis omnibus oblongo-lanceolatis integris. *D. C. l. c. 2. p.* 581.

CRESCIT in Armeniâ (Tournef.), in Persiâ (Gmelin) ♃?

EXPLIC. ICON. LXXXIV. — 1. Flos stellatus anectus. — 2. Flos auctus. 3. Calyx auctus. — 4. Genitalia auctis. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamina aucta, filamentis connatis. — 7. Stamen auctum extra visum. — 8. Ovarium apertum.

BRASSICA MAGELLANICA. Tab. LXXXV.

B. MAGELLANICA. PERS. *Ench.* 2. *p.* 207.

B. herbacea, foliis glabris pectinato-pinnatiperfidis, racemis floralibus subcorymbosis. *D. C. l. c. 2. p.* 595.

CRESCIT ad fretum Magellanicum (Commerson).

EXPLIC. ICON. LXXXV. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum.

BRASSICA BALEARICA. Tab. LXXXVI.

B. BALEARICA. PERS. *Ench.* 2. *p.* 206.

B. glabra, foliis inferioribus petiolatis sinuatis subpanduriformibus subcarnosis, caule laxe suffruticoso, siliquis rostro quintuplo longioribus. *D. C. l. c. 2. p.* 595.

B. sempervirens. Schrank. Hort. Monac. t. 10.

Crescit in insulis Balearicis (Rich.) ♄.

Explic. icon. LXXXVI. — 1. Siliqua dehiscens.

SINAPIS LEPTOPETALA. Tab. LXXXVII.

S. siliquis glabris patulis, petalis linearibus, foliis pinnatifido-runcinatis in petiolo hispidis, ramis umoribus hispidis. *D. C. l. c. 2. p. 610.*

Crescit ad Caput Bonæ-Spei (Sonnerat.) ♃.

Explic. icon. LXXXVII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cum ovario. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen auctum.

SINAPIS TIMORIANA. Tab. LXXXVIII.

S. siliquis glabris multangularibus torulosis rostro tenui quadruplo longioribus, caule foliisque glabris. *D. C. l. c. 2. p. 616.*

Crescit in insulâ Timor.

Explic. icon. LXXXVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum ovario. — 3. Petalum auctum. — 4. Genitalia aucta.

DIPLOTAXIS HISPIDA. Tab. LXXXIX.

Sinapis hispida. *Vahl symb. 2. p. 77.*

D. siliquis pendulis sessilibus, foliis obovatis grosse dentatis hispidis. *D. C. l. c. 2. p. 630.*

Crescit in Ægypto (Forsk. Delile), in Syriâ (Labill.) ⊙.

Explic. icon. LXXXIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Petalum auctum. — 5. Siliqua aperta, dissepimento semisibusque patentibus. — 6. Semen magnitudine naturali. — 7. Id. auctum. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

DIPLOTAXIS SCAPOSA. Tab. XC.

D. siliquis sessilibus erectis, stylo brevi subfiliformi, foliis radicalibus glabris pinnatifidis, lobis brevibus integris, caulibus nudis brevissimis. *D. C. l. c. 2. p. 635.*

Crescit in insulâ Lampedosa (Labill.).

Explic. icon. XC. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum ovario. — 3. Genitalia aucta. — 4. Ovarium auctum. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum intus visum.

— 7. Id. extùs visus. — 8. Siliqua aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversùm sectum. — 12. Embryo denudatus.

CRAMBE ASPERA. Tab. XCI.

C. ASPERA. Bieb. *Fl. taur.* 2 *p.* 90.

C. filamentis longioribus bifurcis, siliculâ muticâ rugosâ, foliis pinnatipartitis, lobis oblongo-linearibus dentatis, cauleque scabris. *D. C. l. c.* 2 *p.* 654.

Crescit in campis Taurinis (Steven), in deserto Caspico et ad Volgam inferiorem (Bieb.) propè Saraptam (Fischer) ♃.

Explic. icon. XCI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen auctum, filamento appendiculato. — 6. Ovarium auctum. — 7. Silicula aucta. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Semen auctum. — 10. Id. transversùm sectum. — Embryo denudatus.

DIDESMUS ÆGYPTIUS. Tab. XCII.

D. ÆGYPTIUS. Delv. *Journ.* 3, *p.* 160.

D. foliis inferioribus ellipticis aut pinnatifido-lyratis, summis oblongis subdentatis. *D. C. l. c.* 2, *p.* 658.

Crescit in Ægypto (Hasselq.), in insulâ Cypro (Sibth.), in campis Astipaleæ d'Urville) ⊙.

Explic. icon. XCII. — Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4-5. Stamina. — 6-7. Siliculæ. — 8. Eadem reticulo ruptâ. — 9. Eadem longitudinaliter secta. — 10. Eadem transversùm secta. — 11. Semen naturali magnitudine. — 12. Id. auctum. — 13. Id. transversùm sectum.

ENARTHROCARPUS PTEROCARPUS. Tab. XCIII.

RAPHANUS PTEROCARPUS. Pers. *Ench.* 2 *p.* 209.

E. siliquis compressis alâ marginatis longè acuminatis, pedicellis ferè omnibus bracteatis. *D. C. l. c.* 2, *p.* 601.

Crescit in Ægypto (Granger) ⊙.

Explic. icon. XCIII. — 1. Flos. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum. — 6. Id. postrè. — Siliqua. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversùm sectum. — 12. Embryo denudatus.

RAPHANUS LANDRA Tab. XCIV

R. Landra Moretti. *Fl. insubr. med.*

R. siliquis unilocularibus articulatis substriatis 2-6-spermis stylo subulato longioribus, foliis interruptè pyratis. *D. C. l. c. 2. p.* 668.

Crescit in Italiâ insubricâ (Moretti).

Explic. icon. XCIV. 1. Calyx auctus genitalia includens. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum latùs visum. — 5. Id. extùs visum. — 6. Siliqua. — 7. Eadem longitudinaliter secta. — 8. Semen auctum. — 9. Id. transversim sectum. — 10. Embryo denudatus.

ERUCARIA LATIFOLIA. Tab. XCV

E. siliquâ stylifer, foliis pinnatipartitis, lobis oblongis inciso-dentatis. *D. C. l. c. 2. p.* 676.

Crescit in Ægypto (Balbis), in Syriâ (P. Russel) ⊙.

Explic. icon. XCV. — 1. Siliqua. — 2. Eadem dehiscens. — 3. Semen naturali magnitudine. — 4. Id. auctum.

HELIOPHILA TENUISILIQUA. Tab. XCVI.

Arabis capensis. Burmand. *Herb.*

H. herbacea, glabra, siliquis tenuissimis compressis submoniliformibus stigmate acuminato terminatis, foliis linearibus integris. *D. C. l. c. 2. p.* 680.

Crescit ad Caput Bonæ-Spei (Burm.) ⊙.

Explic. icon. XCVI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx cum pistillo. — 4. Petalum. — 5. Siliqua. — 6. Semen naturali magnitudine. — 7. Id. auctum. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

HELIOPHILA CRITHMIFOLIA. Tab. XCVII.

H. crithmifolia. Willd. *Enum.* 2. *p.* 68[illegible].

H. herbacea velutino-pubescens, siliquis linearibus mutanibus, foliis pinnatipartitis, subcarnosis, lobis subfiliformibus superne subtus. *D. C. l. c. 2. p.* 689.

Sisymbrium crithmifolium. Roth. *nov. Sp. p.* 225.

Crescit ad Cap. Bonæ-Spei (Burchell.) ⊙.

Explic. icon. XCVII. — 1. Folium caulinarium. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Siliqua. — 7. Semen magnitudine naturali. — 8. Id. auctum. — 9. Id. transversim sectum. — 10. Embryo denudatus.

HELIOPHILA SCOPARIA Tab. XCVIII

Cheiranthus simplex. Poiret *Suppl.* 2 *p.* 78.

H. fruticosa, glabra, siliquis erectis linearibus, stylum brevem aberantibus foliis linearis-subulatis, racemis paucifloris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 695.

Crescit ad Cap. Bonæ-Spei (Burchell.).

Explic. icon. XCVIII. — 1. Calyx auctus clausus. — 2. Flos magnitudine naturali. — 3. Calyx auctus cum genitalibus. 4. Petalum magnitudine naturali. 5. Genitalia aucta. — 6. Siliqua nondum aperta. — 7. Eadem aperta disseminatione seminibusque patentibus. — 8. Semen auctum. — 9. Embryo denudatus.

HELIOPHILA CLEOMOIDES. Tab. XCIX

Cleome capensis. *L. Sp.* 940.

H. siliquis compressis pedicellatis, foliis linearis-lanceolatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 696.

Crescit ad Capum Bonæ-Spei (Lin.), in Monomotapa (Herb. Burm. apud Deless.).

Explic. icon. XCIX. — 1. Calyx auctus cum staminibus. — 2. Ovarium auctum. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum intus visum. 5. Id. extus visum.

BRACHYCARPÆA VARIANS. Tab. C.

Heliophila flava. *L. Suppl.* 297

B. subfruticosa, glabra, siliculis subdidymis, foliis oblongo-linearibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 699.

Crescit ad promontorium Bonæ-Spei.

Explic. icon. C. — 1. Flos. — 2. Genitalia. 3. Calyx. — 4. Stamen. 5. Petalum. 6. Siliquæ calyce vestitæ. — 7. Siliqua. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Eadem transversim secta.

FINIS.

Ex Typis HUZARD-COURCIER (Societas Anonyma) n. 12



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

BERBERIS asiatica. *(Roxb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 13.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

BERBERIS tinctoria. *(Desch.)*



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

MAHONIA fascicularis. *(DC)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 19)



Turpin del.t et direx.t *Dien sulp.t*

MAHONIA Napaulensis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 21.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

NYMPHÆA reniformis. *(Walt.)*

(D.C. Regn. veg. vol. 2. pag. 55.)

Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

NUPHAR Japonica. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 62.)

Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

PAPAVER setigerum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 81.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

RŒMERIA refracta. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 93.)

A. CORYDALIS pauciflora. (Pers.) B. DICLYTRA tenuifolia. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. 115 et 110.)



Turpin del. et direx.t

CORYDALIS Marschalliana. (Pers.)

(DC. Regn. veg. syst. 2. pag. 116.)

Plée sculp.t



MATHIOLA oxyceras. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 173.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

MATHIOLA livida. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 174.)

CHEIRANTHUS leptophyllus. (Bieb.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 182.)



Turpin del.t et direx.t

Dien sculp.t

NASTURTIUM glaucophyllum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 195.)

Turpin. del.t et direx.t Plée sculp.t

NASTURTIUM natans. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 198.)

Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

NOTOCERAS quadricornis. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 204.)



Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

NOTOCERAS Hispanicum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 204.)



NOTOCERAS cardaminefolium. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 205.)



BARBAREA plantaginea. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 208.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

STEVENIA alyssoides. *(Ad.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 209)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

STEVENIA cheiranthoides. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 210.)

Turpin dell.t et direx.t *Dien. sculp.t*

BRAYA Alpina. *(Sternb. et Hop.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 211.)

ARABIS rosea. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 215.)



ARABIS Billardierii. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 218.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ARABIS longifolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 219.)

Turpin pinx.t et direx.t Mr. Rebel sculp.t

ARABIS Cebennensis. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 234.)

Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ARABIS Patriniana. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 236.)

ARABIS Canadensis. (Lin.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 238.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

CARDAMINE tuberosa. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 254.)



A. CARDAMINE hederacea. (DC.) B. CARDAMINE petiolaris. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 264.)



CARDAMINE glauca. (Spr.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 266.)



CARDAMINE maritima. (Port.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 266.)



Turpin del.et direxit *Plée sculp.t*

DENTARIA quinquefolia. *(Bieb.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 277.)



FARSETIA eriocarpa. *(DC.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 288.)



Turpin del.t et direx.t Dien. sculp.t

VESICARIA vestita. (Desv.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 299.)



SCHIWERECKIA Podolica. *(Bess.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 300.)



Turpin del.t et direx.t Dien. sulp.t

ALYSSUM spathulatum. (Steph. in Willd.)

(D.C. Regn. veg. vol. 2. pag. 304.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ALYSSUM obtusifolium. *(Stev.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 305.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ALYSSUM micropetalum. *(Fisch.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 313.)



Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

ALYSSUM hirsutum. (Bieb.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 314.)

Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ALYSSUM macrocarpum. *(DC)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 821.)



Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

MENIOCUS linifolius. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 326.)

Pierpin. del.t et direx.t Dien. sculp.t

PELTARIA glastifolia. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 330.)



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.t*

DRABA incompta. *(Steev.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 340.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

DRABA mollissima. *(Stev.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 341.)



A. DRABA lævipes. (DC.) B. DRABA stellata. (Jacq.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 346.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

DRABA grandis. (Langsd.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 355.)



Turpin pinx.t et direx.t Dien sculp.t

COCHLEARIA Pyrenaica. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 365.)



COCHLEARIA velutina. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 370.)



COCHLEARIA saxifragæfolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 670.)

Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

THLASPI latifolium. *(Bieb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 374.)



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.t*

THLASPI cochleariforme. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 381.)



HUTCHINSIA trinervia. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 387.)

IBERIS conferta. (Lag.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 298.)



BISCUTELLA erigerifolia. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 408.)



Turpin del.t et direx.t

Ploe sculp.t

MENONVILLEA linearis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 420.)



Trapin del.t et direx.t Dien sculp.t

CAKILE æqualis. (L'her.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 430.)



CHORISPORA Iberica. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 457.)

Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

MALCOMIA incrassata. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 441.)



Turpin delt. et direx.t Plée sculp.t

MALCOMIA Broussonetii. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 445.)

HESPERIS alyssifolia. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 447.)

Turpin pinx.t et direx.t Dien sculp.t

HESPERIS aprica. (Poir.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 452.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

A. SISYMBRIUM exacoides. (DC.) B. SISYMBRIUM contortuplicatum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 463 et 483.)



Turpin del.t et direxit *Plée sculp.t*

SISYMBRIUM lyratum. *(Burm.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 471.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ERYSIMUM siliculosum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 492.)

Turpin del. et direx.t Plée sculp.t

ERYSIMUM aureum. *(Bieb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 498.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

ERYSIMUM rigidum. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 505.)



Turpin del.t et direx.t

Plée père sculp.t

A. LEPTALEUM filifolium. (DC.)

B. LEPTALEUM pygmæum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 511.)



CAMELINA microcarpa. (Andrz.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 517.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

CAMELINA barbaræfolia. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 517.)



Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

SENEBIERA serrata. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 626.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

LEPIDIUM spinescens. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 634.)



Turpin del.t et direxit Plée sculp.t

LEPIDIUM Africanum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 552.)



Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

ÆTHIONEMA cristatum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 560.)



Turpin del.t et direx.t Plée, sculp.t

ÆTHIONEMA membranaceum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 865.)

Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

ÆTHIONEMA coridifolium. (DC)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 561.)

Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ISATIS Garcini. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 565.)



ISATIS littoralis: *(Stev.)*

(D.C. Regn. veg. vol. 2. pag. 668.)

Turpin pinx.t et direx.t *Dien. sculp.t*

ISATIS hebecarpa. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 569.)

Turpin del. et direx. *Plee. sculp.*

SOBOLEWSKIA lithophila. *(Bieb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 575.)

Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

GOLDBACHIA lævigata. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 577.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

ANCHONIUN Billardierii. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 578.)



Turpin delt. et direxit. Dien sculpt.

STERIGMA sulfureum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 580.)

Turpin del.t et direx.t Plee sculp.t

STERIGMA elychrysifolium. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 581.)

BRASSICA Magellanica. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 595.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

BRASSICA Balearica. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 596.)



SINAPIS leptopetala. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 630.)



Turpin. del.t et direx.t Coignet sculp.t

SINAPIS Timoriana. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 616.)

DIPLOTAXIS hispida. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 630.)



DIPLOTAXIS scaposa. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 635.)



Pirpin. del.t et direx.t Dien sculp.t

CRAMBE aspera. (Bieb.)

(D.C. Regn. veg. vol. 2 pag. 654)

Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

DIDESMUS, Ægyptius. (Desv.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 638.)

ENARTHROCARPUS pterocarpus. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 661.)



Turpin pinx.t et dirx.t Mlle Coignet sculp.t

RAPHANUS Landra. (Mor.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. Pag. 668.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ERUCARIA latifolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 675.)



HELIOPHILA tenuisiliqua. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 680.)



HELIOPHILA crithmifolia. (Willd.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 689.)



Turpin del.t et direx.t Mc Rebel sculp.t

HELIOPHILA scoparia. (Burch.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 693.)



HELIOPHILA cleomoides. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 695.)



BRACHYCARPÆA varians. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 609.)